



TRƯỜNG THPT QUANG
TRUNG
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM 2026 - 2027
Môn thi: VẬT LÝ – LỚP 12
Thời gian làm bài: 50 phút (không tính thời gian phát đề)

Họ và tên: Siêu Giỏi..... Số báo danh: Mã đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Theo mô hình động học phân tử thì

- A. giữa các phân tử chỉ có lực hút.
- B. các phân tử chuyển động không ngừng.
- C. giữa các phân tử không có khoảng cách.
- D. giữa các phân tử chỉ có lực đẩy.

Câu 2. Hơ nóng một khối khí trong ống nghiệm có nút đây kín (Hình a) và kết quả (Hình b). Hiện tượng nút bị đây bật ra khỏi ống là do nội năng của chất khí

- A. không thay đổi.
- B. tăng lên.
- C. bị mất đi.
- D. giảm xuống.

Câu 3. Nhiệt độ cơ thể người bình thường là 37°C . Trong thang nhiệt giai Kelvin kết quả đo nào sau đây là đúng?

- A. 98,6K.
- B. 236K.
- C. 310K.
- D. 37K.

Câu 4. Đơn vị của nhiệt dung riêng trong hệ SI là

- A. J/g.độ.
- B. kJ/kg.độ.
- C. J/kg.độ.
- D. cal/g.độ.

Câu 5. Một khối khí lí tưởng xác định có áp suất 1 atm được làm tăng áp suất đến 4atm ở nhiệt độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng 12 lít. Thể tích ban đầu của khối khí đó là

- A. 48 lít.
- B. 16 lít.
- C. 24 lít.
- D. 36 lít.

Câu 6. Cylinder A chứa khí Oxygen (O_2) và cylinder B chứa khí Nitrogen (N_2). Nếu các phân tử trong hai cylinder có cùng vận tốc trung bình bình phương (*RMS speed*) thì nhận định nào sau đây là sai?

- A. Hai loại khí có nhiệt độ khác nhau.
- B. Nhiệt độ của khí trong cylinder B thấp hơn nhiệt độ của cylinder A.
- C. Nhiệt độ của khí trong cylinder B cao hơn nhiệt độ của cylinder A.
- D. Động năng trung bình của các phân tử nito nhỏ hơn động năng trung bình của các phân tử oxy.

Câu 7. Nén 10l khí ở nhiệt độ 27°C để cho thể tích của nó chỉ còn là 4l, vì nén nhanh khí bị nóng lên đến 60°C . Hỏi khi đó áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần?


- A. 2,24.
- B. 2,85.
- C. 2,78.
- D. 3,20.

Câu 8. Một lượng khí gồm N phân tử chứa trong một bình kín, đặt $\bar{E}_d = \frac{mv^2}{2}$ là động năng trung bình của các phân tử khí và $\mu = \frac{N}{V}$ là mật độ phân tử khí thì. Áp suất của lượng khí trên tác dụng lên thành bình là

- A. $p = \frac{4}{3}\mu\bar{E}_d$.
- B. $p = \frac{2}{5}\mu\bar{E}_d$.
- C. $p = \frac{1}{3}\mu\bar{E}_d$.
- D. $p = \frac{2}{3}\mu\bar{E}_d$.

Câu 9. Một khối lượng khí 6g đang ở trạng thái có thể tích 4 lít ở nhiệt độ 7°C . Sau khi được đun nóng đẳng áp thì khối lượng riêng của khí là 0,8 g/lít. Xác định nhiệt độ của khí sau khi được đun nóng?

- A. 252°C .
- B. 247°C .
- C. 427°C .
- D. 525°C .





Câu 10. Một em bé có khối lượng 23,2 kg bị sốt ở nhiệt độ $39,0^{\circ}\text{C}$ được cho dùng thuốc hạ sốt. Giả sử cơ chế bay hơi của mồ hôi (coi như 100% thành phần là nước) là cách duy nhất để làm giảm nhiệt độ cơ thể. Nhiệt dung riêng của cơ thể con người bằng nhiệt dung riêng của nước là 1000 cal/kg.K và nhiệt hóa hơi riêng của nước khoảng 580 cal/g . Nếu nhiệt độ cơ thể hạ xuống $37,5^{\circ}\text{C}$ sau 50 phút thì tốc độ bay hơi trung bình của mồ hôi do thuốc gây ra là bao nhiêu?



- A. 0,2 kg/phút. B. 1,2 g/phút.
C. 1,2 mg/phút. D. 0,2 g/phút.

Câu 11. Chọn nhận định **đúng**. Khi ấn piston từ từ xuống để nén khí trong cylinder thì

- A. áp suất khí tăng. B. nhiệt độ khí tăng.
C. nhiệt độ khí giảm. D. áp suất khí giảm.

Câu 12. Chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Brown chứng tỏ các

- A. hạt phấn hoa hút và đẩy các phân tử nước.
B. phân tử nước không đứng yên mà chuyển động không ngừng.
C. phân tử nước hút và đẩy hạt phấn hoa.
D. phân tử nước lúc thì đứng yên, lúc thì chuyển động.

Câu 13. Đẳng quá trình là quá trình biến đổi trạng thái của một khối khí xác định trong đó

- A. hai thông số không đổi, một thông số thay đổi.
B. nhiệt độ thay đổi, khối lượng tăng.
C. một thông số không đổi, hai thông số thay đổi.
D. khối lượng không đổi, áp suất giảm.

Câu 14. Trong hệ trục tọa độ OVT, đường đẳng áp của một lượng khí xác định là một đường

- A. thẳng song song với trục OV. B. thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.
C. thẳng song song với trục OT. D. cong hypebol.

Câu 15. Khi đúc một vật bằng đồng, quá trình đồng chuyển từ thể lỏng thành thể rắn là quá trình

- A. đông đặc. B. hoá hơi. C. nóng chảy. D. ngưng tụ.

Câu 16. Khi hà hơi vào mặt kính cửa sổ sẽ xuất hiện những giọt nước li ti làm mờ kính. Đây là kết quả của hiện tượng

- A. ngưng kết. B. bay hơi. C. đông đặc. D. ngưng tụ.

Câu 17. Động năng trung bình của phân tử khí ở nhiệt độ $T(\text{K})$ được xác định bằng hệ thức

- A. $\overline{E_d} = \frac{1}{2}RT$. B. $\overline{E_d} = \frac{3}{2}kT$. C. $\overline{E_d} = \frac{1}{2}kT$. D. $\overline{E_d} = \frac{2}{3}RT$.

Câu 18. Hãy chọn câu **đúng**. Khi làm nóng một lượng khí xác định có thể tích không đổi thì

- A. số phân tử trong đơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt độ.
B. số phân tử trong đơn vị thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ.
C. áp suất khí không đổi khi ta tăng nhiệt độ.
D. số phân tử trong đơn vị thể tích không đổi.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Nhận định các phát biểu sau đây khi nói về cấu tạo chất?

- a) Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng gọi là nguyên tử, phân tử.
b) Các nguyên tử, phân tử đứng sát nhau và giữa chúng không có khoảng cách.
c) Lực tương tác giữa các phân tử ở thể rắn lớn hơn lực tương tác giữa các phân tử ở thể lỏng và thể khí.
d) Các nguyên tử, phân tử chất rắn dao động xung quanh các vị trí cân bằng không cố định.

Câu 2. Nhận định các phát biểu sau đây khi nói về chuyển động Brown?

- a) Chuyển động Brown chỉ xảy ra trong chất khí.
b) Chuyển động Brown có thể xảy ra trong chất lỏng và chất khí.
c) Chuyển động Brown không thể xảy ra trong chất lỏng.





d) Chuyển động Brown là chuyển động hỗn loạn, không ngừng của các hạt nhẹ trong chất lỏng và chất khí.

Câu 3. Người ta cung cấp nhiệt lượng Q để làm nóng chảy 200g nước đá ở -20°C . Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,34 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ và nhiệt dung riêng của nước đá là $2,1 \cdot 10^3 \text{ J/kg.K}$. Nhận định các phát biểu sau?


a) Nhiệt dung riêng của nước đá là $2,1 \cdot 10^3 \text{ J/kg.K}$ có nghĩa ta cần cung cấp nhiệt lượng $2,1 \cdot 10^3 \text{ J}$ cho 1kg nước đá thì nhiệt độ của nó tăng thêm 274K .

b) Trong quá trình nóng chảy, nước đá toả nhiệt ra môi trường ngoài.

c) Tính đến thời điểm nóng chảy, nhiệt độ khối nước đá giảm đi 20°C .

d) Nhiệt lượng cần cung cấp cho khối nước đá trên để nó nóng chảy hoàn toàn là 752kJ .

Câu 4. Đồ thị bên là quá trình biến đổi của một khối khí lý tưởng từ trạng thái (1) đến trạng thái (2). Nhận định các phát biểu sau?



a) Đồ thị cho biết áp suất P được tính theo đơn vị atm tỉ lệ thuận với nhiệt độ Celsius.


b) Đồ thị biểu diễn quá trình nung nóng đẳng tích.

c) Nhiệt độ của khí ở trạng thái (2) là 27°C .

d) Khối lượng riêng của khối khí ở trạng thái (2) nhỏ hơn ở trạng thái (1) ba lần.

PHẦN III: TRẢ LỜI NGẮN.

Câu 1. Phổi có tác dụng trao đổi khí cho quá trình hô hấp. Khi hít vào, cơ hoành co lại, hạ xuống và làm tăng dung tích phổi, giúp không khí đi vào phổi để hấp thụ Oxygen (O_2) từ không khí vào máu. Khi thở ra, cơ hoành giãn ra, nâng lên và làm giảm dung tích phổi, đẩy không khí ra khỏi phổi để thải ra Carbon dioxide (CO_2) từ máu ra ngoài không khí. Trong quá trình hô hấp, thể tích phổi của một người trưởng thành trung bình tăng từ 3,0 lít lên 3,5 lít. Giả sử rằng nhiệt độ và số mol không khí không đổi. Hãy tính sự thay đổi áp suất bên trong phổi nếu áp suất ban đầu là 1,0 atm? (Kết quả tính theo đơn vị atm và làm tròn đến hàng phần trăm).



Câu 2. Người ta thực hiện công 200 J để nén khí trong một cylinder. Biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 40 J. Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu Joule? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 3. Trong bảng tin Dự báo thời tiết ngày 25-12-2025, nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong ngày lần lượt là 27°C và 16°C . Độ chênh lệch nhiệt độ đó trong thang nhiệt giai Kelvin là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).


Câu 4. Thể tích của một lượng khí xác định tăng thêm 10% khi nhiệt độ của khí được tăng tới 47°C . Xác định nhiệt độ ban đầu của lượng khí trong thang nhiệt giai Celsius? Biết trong quá trình trên áp suất khí được giữ không đổi. (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).





Câu 5. Tính tốc độ căn quân phương (theo đơn vị m/s) trong chuyển động nhiệt của phân tử khí Helium có khối lượng mol là $4 \cdot 10^{-3}$ kg/mol ở nhiệt độ 320K. Coi các phân tử khí là giống nhau. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 6. Một ống thủy tinh một đầu kín, chứa một lượng khí. Ấn miệng ống thẳng đứng vào chậu thủy ngân sao cho chiều cao ống còn lại là 10cm. Ở 25°C mực thủy ngân trong ống cao hơn trong chậu 4cm. Biết áp suất khí quyển khi đó là $p_0 = 750\text{mmHg}$. Coi mực thủy ngân trong chậu dâng lên không đáng kể. Hỏi để mực thủy ngân trong ống bằng trong chậu thì phải tăng nhiệt độ thêm bao nhiêu độ C? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



----- THE END -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

